

Réseau des sylviculteurs/trices en faveur des bois précieux


Fiche signalétique : Côte de la Chaux (JU)		Mise à jour 2012	OBJET no 014																																																		
<p>Localisation coord.: X: 597.500 Y : 241.075</p> <p>commune. Rebeuvelier (JU) surface (a) : 25 (100) altitude :650 exposition : sud mm/an : 1100 pente % : 35-45 assoc. végétale EK : hêtraie à laïches</p> 	<p>Sylviculteur</p> <p>Francis Unterährer garde forestier de triage Tél : 079-652'21'55 e-mail : trriage.raimeux@bluewin.ch</p> 																																																				
Spécificité propre au réseau: Erable feuilles obier- alisier blanc- Erable sycomore																																																					
Technique/méthode sylvicole: sylviculture d'arbre, concentrer l'accroissement sur les arbres de place																																																					
Données du peuplement/objet (en 2012)																																																					
<p>Peupl. principal : stade développement, âge</p> <p>Fourré à bas perchis avec quelques baliveaux sur ancienne coupe 1997/98, issu rajeunissement naturel ; âge = env. 12-14 ans, le démelange est en cours → tendance hê</p> <p>Peuplement accessoire</p> <p>strate buissonnante dense: troène, aubépine</p> <p>Origine</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>essence</th> <th>nat.</th> <th>artific.</th> <th>origine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>érable obier</td> <td>X</td> <td></td> <td>après coupe progressive de 1997/98</td> </tr> <tr> <td>érable syc.</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>alisier blanc</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>hêtre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		essence	nat.	artific.	origine	érable obier	X		après coupe progressive de 1997/98	érable syc.	X			alisier blanc	X			hêtre	X			<p>Genre/degré /forme du mélange (en %, abrégé)</p> <p>strate sup: quelques baliveaux pins - hê strate moy.: 30 Er-obier – 20 ér syc – 20 – al blanc – 30 hê strate inf.: buissonnante, avec hê, frê, troène</p> <p>Différentiation sociologique des essences</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>essence</th> <th>Er-obier</th> <th>Er syc</th> <th>Al blanc</th> <th>Hê</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prédominant</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>dominant</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>codominant</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>dominé</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>surcimé</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		essence	Er-obier	Er syc	Al blanc	Hê	prédominant	X			X	dominant	X	X		X	codominant		X	X	X	dominé			X		surcimé				
essence	nat.	artific.	origine																																																		
érable obier	X		après coupe progressive de 1997/98																																																		
érable syc.	X																																																				
alisier blanc	X																																																				
hêtre	X																																																				
essence	Er-obier	Er syc	Al blanc	Hê																																																	
prédominant	X			X																																																	
dominant	X	X		X																																																	
codominant		X	X	X																																																	
dominé			X																																																		
surcimé																																																					
Sylviculture																																																					
<p>Objectif et principes cultureux</p> <p>Sélection positive de 12 candidats désignés (2013) sur 25 a ; réseau env. 12m – 15m ; maintenir l'érable f. obier</p> <p>But de composition : 40 ér obier – 20 al blanc – 30 érable syc – 10 hê</p> <p>Mesures</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>interventions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997/98</td> <td>Coupe vieille futaie</td> </tr> <tr> <td>1998-12</td> <td>Aucune intervention !</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Date	interventions	1997/98	Coupe vieille futaie	1998-12	Aucune intervention !											<p>Suite „mesures</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>interventions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>Eclaircies au fourré à bas perchis</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarques : prochainement : soins ciblés sur les arbres de place, dégagement houppiers</p>		Date	interventions	2014	Eclaircies au fourré à bas perchis																														
Date	interventions																																																				
1997/98	Coupe vieille futaie																																																				
1998-12	Aucune intervention !																																																				
Date	interventions																																																				
2014	Eclaircies au fourré à bas perchis																																																				

Réseau des sylviculteurs/trices en faveur des bois précieux

Sujets témoin mesurés (objet no 014)

no	essence	âge	allure	Ø	circ.	H _{tot}	H _{pied}	date
1	Erable f. obier	15	un peu courbe au pied	13	40	6	3	01.10.12
2	Erable f. obier	20	droit	16	49	7	4	01.10.12
3	Merisier	15	droit	4.5	14	4	2	01.10.12
4	Erable f. obier	30	préexistant, penché vers le sud	36	114	16	4	01.10.12
5	Erable syc	15		7	23	5	2.5	01.10.12
6								

Localisation des sujets témoin (schématiquement)



Informations supplémentaires

→ photos